



<https://www.revclinesp.es>

179 - ADECUACIÓN A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL MANEJO DE LA EPOC. INTERANÁLISIS DEL ESTUDIO ADEG-EPOC

M.C. López Ríos^{1,2}, S. Peña Balbuena^{2,3}, J.C. Piñeiro Fernández^{2,4}, X. Pena Pérez^{2,5}, M.L. Taboada Martínez^{2,6}, C. Llamazares Mendo^{2,7}, J. Portillo Sánchez^{2,8}, P. Martínez García^{2,9}, N. Jiménez García^{2,10}, N. Galofré Alvar^{11,2}, J. Elvira González^{2,12}, E. Ascuña Vásquez^{2,13}, R. Boixeda Biu^{2,14} y F.J. Medrano Ortega^{1,2}

¹Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. ²Grupo de Trabajo de EPOC de la SEMI. ³Hospital Clínico de Salamanca. Salamanca. ⁴Hospital Universitario Lucus Augusti. Lugo. ⁵Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona. ⁶Hospital de Cabueñez. Gijón. ⁷Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. ⁸Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real. ⁹Hospital San Agustín. Avilés. ¹⁰Hospital Costa del Sol. Marbella. ¹¹Hospital Municipal de Badalona. Barcelona. ¹²Hospital Santa María del Puerto. Cádiz. ¹³Hospital de Vinalopó. Elche. Alicante. ¹⁴Hospital del Mataró. Barcelona.

Resumen

Objetivos: Describir las características clínicas de los pacientes que requieren de ingreso hospitalario por exacerbación de su EPOC en los servicios de Medina Interna en España, evaluar la adecuación en el manejo clínico y tratamiento de la EPOC a las recomendaciones de las dos guías clínicas (GOLD y GesEPOC) de mayor uso en nuestro país en los pacientes hospitalizados por exacerbaciones de la enfermedad y analizar la posible variabilidad geográfica y por sexo en su aplicación.

Métodos: Estudio multicéntrico (19 hospitales españoles), observacional, longitudinal y prospectivo que incluye pacientes hospitalizados de forma consecutiva desde enero de 2020, cuyo motivo de ingreso principal sea la exacerbación de EPOC. Se realizó un análisis intermedio incluyendo los primeros 151 pacientes con registros completos a fecha 1 de junio de 2021, analizándose las características demográficas y clínicas al ingreso, el manejo durante la hospitalización y el tratamiento prescrito al alta, comparando estos datos con las recomendaciones de las guías de práctica clínica (GesEPOC y GOLD) para valorar la adecuación a las mismas, de manera global, por área geográfica y por sexo.

Resultados: Se incluyeron 151 pacientes. El 82,8% varones de unos $75,3 \pm 9,9$ años, con comorbilidad asociada importante (índice medio ce Charlson corregido por edad de $6,3 \pm 2,5$, y obstrucción grave de la vía aérea (FEV1 $48,7 \pm 16,5\%$). La adecuación a las GPC en la evaluación inicial al ingreso y en el tratamiento de la exacerbación fue baja (en torno al 30% en la adecuación global de ambas guías) tanto a nivel nacional como por áreas geográficas, mientras que por sexo existe una mayor adecuación en mujeres ($p = 0,0067$ respecto a la evaluación clínica al ingreso; y $p = 0,0063$ para la adecuación global según la guía GOLD). La adecuación respecto al tratamiento del EPOC estable es mayor ($> 60\%$ en todos los casos).

Global	Norte	Centro	Sur	p
(n = 151)	(n = 77)	(n = 37)	(n = 37)	

Características clínicas y pronósticas

Edad (años), media ± DE	75,3 ± 9,9	75,8 ± 9,7	76,8 ± 8,5	72,6 ± 11,1	0,139*	7
Sexo (varón), n (%)	82,9	85,7	81,6	77,8	0,584**	2
IMC (kg/m ²), media ± DE	27,4 ± 6,4	26,1 ± 5,1	28,5 ± 5,9	29,0 ± 7	0,043*	4
FEV1, media ± DE	48,7 ± 16,5	47,7 ± 16,2	52,4 ± 12,2	46,7 ± 16,3	0,257*	9
Saturación de O ₂ (%), media ± DE	90 ± 8	90,1 ± 5,6	88,9 ± 12,0	92,0 ± 4,5	0,299*	1
Índice CAT, media ± DE	19,3 ± 8,3	19,2 ± 8,4	17,8 ± 7,8	21,3 ± 8,7	0,240*	9
Eosinófilos ($\times 10^6$ /L sangre), media ± DE	91 ± 153	92 ± 105	73 ± 81	111 ± 287	0,626*	6
Proteína C reactiva (mg/L), media ± DE	60,9 ± 84,7	58,8 ± 74,3	40,0 ± 63,7	99,1 ± 125,6	0,031*	4
Disponibilidad VMNI,%		76,2	23,8	100	0,011*	4
Índice BODEX, media ± DE	4,0 ± 2,1	3,9 ± 2,3	3,9 ± 1,7	4,6 ± 2,0	0,316*	6
Índice CODEX, media ± DE	4,7 ± 2,1	4,7 ± 2,2	4,2 ± 1,9	5,4 ± 2,1	0,285*	7
Índice Charlson corregido por edad, media ± DE	6,2 ± 2,5	6,5 ± 2,6	6,5 ± 2,4	5,3 ± 1,7	0,091*	2
Adecuación de la evaluación clínica de las exacerbaciones (%)						
AE.01. Se valora la gravedad basada en el grado de obstrucción (GOLD)	61,6	80,3	70,0	71,4	0,466**	

AE.02. Se valora el N° episodios previos de exacerbación en el último año	53,0	73,2	76,7	23,8	,001**
AE.03. Se valoran comorbilidades	80,1	100	100	95,2	0,172**
AE.04. Se valora el uso de musculatura accesoria	68,2	77,5	96,7	90,5	0,037**
AE.05. Se valora existencia de inestabilidad hemodinámica	72,8	83,1	100	100	0,002**
AE.06. Se realiza radiografía de tórax	80,1	98,6	100	100	1,000**
Adecuación global (cumplimiento de todas las recomendaciones)	33,8	42,3	56,7	19,0	0,024**
Adecuación del tratamiento de las exacerbaciones (%)					
AT.01 Uso de beta2-agonista y/o anticolinérgicos de corta duración	78,1	95,8	96,8	95,2	0,956**
AT.02 Uso de corticoides sistémicos o inhalados	74,2	94,4	96,6	81,0	0,213**
AT.03 Uso de corticoides sistémicos	74,2	94,4	96,6	81,0	0,213**
AT.04 Uso de corticoides sistémicos 40-60 mg de prednisona/día durante 5-10 días	49,0	80,3	37,9	30,0	,001**
AT.05 Uso antibioterapia según criterios de Anthonisen GOLD* y/o en pacientes con VM	72,0	84,5	90,0	90,5	0,620**

AT.06 Uso antibioterapia según criterios de Anthonisen GesEPOC** y/o en pacientes con VM	72,2	87,3	93,3	90,5	0,169**
AT.07 Uso de HBPM o anticoagulación en pacientes con riesgo ajustado PRETEMED > 4	62,9	73,2	90,0	76,2	0,162**
AT.08 Uso de VMNI según indicaciones GesEPOC**	64,2	76,1	93,1	95,2	0,034**
AT.09 Uso de VMNI según indicaciones GOLD*	62,9	74,6	83,3	95,0	0,097**
Adecuación global a la guía GOLD(cumplimiento de todas las recomendaciones)	30,5	43,7	33,3	23,8	0,213**
Adecuación global a la guía GesEPOC (cumplimiento de todas las recomendaciones)	33,8	49,3	37,9	23,8	0,100**
Adecuación del tratamiento de la EPOC estable (%)					
ATE.01 Tratamiento adecuado de la EPOC estable al ingreso según GOLD	78,1	78,9	83,3	85,7	0,853**
ATE.02 Tratamiento adecuado de la EPOC estable al alta según GOLD	64,9	76,1	90,0	81,0	0,287**
ATE.03 Tratamiento adecuado de la EPOC estable al ingreso según GesEPOC	74,2	74,6	86,7	95,2	0,076**
ATE.04 Tratamiento adecuado de la EPOC estable al alta según GesEPOC	62,9	73,2	90,0	76,2	0,178**

Conclusiones: 1. Los resultados de este análisis preliminar indican que en España el perfil del paciente que precisa de ingreso hospitalario por exacerbación de su EPOC es similar al descrito previamente (varón exfumador de 75 años con sobrepeso y una enfermedad respiratoria avanzada de alto riesgo), pero con mayor comorbilidad. 2. La adecuación global a las guías clínicas GOLD y GesEPOC respecto al manejo y tratamiento de las exacerbaciones agudas de EPOC y al tratamiento de la EPOC estable en los servicios de Medicina Interna españoles es baja, existiendo aún un importante margen de mejora. 3. En nuestro país existe cierta variabilidad, no descrita previamente, en la aplicación de las guías clínicas a los pacientes hospitalizados por exacerbaciones de la EPOC, no habiéndose detectado diferencias geográficas en la adecuación del tratamiento de la EPOC estable, y mayor adherencia a las recomendaciones sobre el manejo de las exacerbaciones en mujeres con la enfermedad, tanto en la evaluación clínica como en su tratamiento.