Rev Clin Esp. 2021;222(Espec Congr 2):505

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

1400 - PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN PACIENTES PLURIPATOLÓGICOS

N. Carracedo Falagán, *M. Vázquez del Campo, E. Magaz García, M.P. Diez Mateos, A.R. Álvarez Pérez y A. Morán Blanco*

Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE). León.

Resumen

Objetivos: Establecer la prevalencia de la enfermedad renal crónica (ERC) en un grupo definido de pacientes pluripatológicos.

Métodos: Se revisan los pacientes derivados a la Unidad de Continuidad Asistencial y que pertenecen a dos Centros de Salud del Área Sanitaria de León (enero de 2014 y diciembre de 2017). Se usó el programa estadístico SPSS v 20 para Mac.

Resultados: Son 76 pacientes con algún grado de enfermedad renal crónica de un total de 170 (45%). La edad media es de 84 ± 15 frente a los 79 ± 20 años de los que tienen la función renal normal (IC 1,8 a 7,4; p 0,001). El 52% (89) son hombres. La prevalencia de ERC grave (estadios IV y V) es del 10% en el total de la muestra, no hay diferencias por edad ni sexo. El índice de Charlson modificado es 8,6 para las formas moderadas frente al 9 en las graves (IC95% 0,7 a 1,5; p 0,4). Analizando las comorbilidades por separado tampoco encontramos diferencias entre los grupos. La situación funcional es algo mejor en las formas severas pero sin diferencias (índice Barthel 67 *vs.* 71; p 0,5). Tampoco unos toman más fármacos que los otros (10 *vs.* 11; p 0,2).

Estadio	Hombres	Mujeres	P
IIIA	19	19	0,4
IIIB	10	11	0,4
IV	8	6	0,4
V	0	3	0,4

Conclusiones: La prevalencia de ERC en una muestra de pacientes pluripatológicos es del 45% y está influenciada por la edad. Las formas graves llegan al 10% sin observar ninguna relación con factores a los que se asocien.

0014-2565 / © 2021, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.