Rev Clin Esp. 2023;224(Supl 2):S198

Revista Clínica Española

https://www.revclinesp.es

1573 - ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y SEROLÓGICAS EN PACIENTES CON SÍNDROME DE SJÖGREN DIAGNOSTICADOS ENTRE 2019 Y 2023

Elena Gloria Torres García, *Lucía Platero Dueñas, Raquel Sorriguieta Torre, Camilo Mendienta Rodríguez, Juan José Ríos Blanco, Elena Martínez Robles, Jorge Álvarez Troncoso y Clara Itziar Soto Abánades*

Hospital La Paz, Madrid, España.

Resumen

Objetivos: Este estudio buscó caracterizar y diferenciar las presentaciones clínicas y serológicas en pacientes con síndrome de Sjögren seronegativo (SS-Ro-) y seropositivo (SS-Ro+), utilizando una evaluación multiparamétrica que incluyó el test de Schirmer, la medición del flujo salival, la detección de anti-Ro y la biopsia de glándulas salivares menores (BGSA).

Métodos: Estudio observacional prospectivo de pacientes diagnosticados de síndrome de Sjögren en una Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas entre 2019 y 2023. Se analizaron las características clínicas y serológicas de los pacientes.

Resultados: Se incluyeron 132 pacientes con SS (35 SS-Ro- y 97 SS-Ro+). Los pacientes con SS-Ro- demostraron una mayor frecuencia de BGSA+ (FS ≥ 1) (100%), diabetes (22,86%), VHC (5,71%), mielitis (5,71%) y sialoadenitis linfocítica focal (88,57%). Además, se observaron mayores proporciones de esclerodermia (11,43%) y patología neurológica (25,71%), aunque estas diferencias no alcanzaron la significación estadística. Los pacientes con SS-Ro+ mostraron una mayor prevalencia de ANA+ (96,91%), Anti-La+ (27,66%), C3 bajo (8,25%), C4 bajo (22,68%), IgG ≥ 1.600 (25,77%), IgA ≥ 300 (35,05%), factor reumatoide+ (40,70%) y dilatación ductal (54,22%). Se encontró también un porcentaje mayor de pacientes con hipoacusia neurosensorial (42,86%) y FS ≥ 3 (11,34%) en el grupo SS-Ro+, aunque estos resultados no fueron estadísticamente significativos.





Conclusiones: Nuestro estudio prospectivo multiparamétrico revela diferencias significativas en las manifestaciones clínicas y serológicas entre los pacientes con SS-Ro- y SS-Ro+. Se observaron diferencias porcentuales relevantes en algunas condiciones clínicas a pesar de no alcanzar significación estadística. Estos hallazgos pueden ayudar a mejorar la precisión diagnóstica y la estratificación terapéutica de los pacientes con síndrome de Sjögren.

0014-2565 / © 2023, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.