

Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

1642 - PACIENTES CON IC CRÓNICA Y EL USO DE ARM EN FEVI PRESERVADA Y REDUCIDA

Ana Carmona Bernal¹, Marta Pilar Díaz Barrera¹, Dolores Rico López², Noor Mohamed Ahmed², Lara García Perales¹, Antonio Bustos Merlo³, Manuel Jesús Raya Cruz⁴ y Francisco Gómez Delgado⁴

¹Medicina Interna, Médico Interno Residente, Jaén, España. ²Medicina Interna, Médico Interno Residente, Granada, España. ³Medicina Interna, Facultativo Especialista de Área, Granada, España. ⁴Medicina Interna, Facultativo Especialista de Área, Jaén, España.

Resumen

Objetivos: Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides (ARM) han mostrado beneficios clínicos significativos, especialmente en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida. Sin embargo, su uso en pacientes con FEVI preservada continúa siendo objeto de debate. El objetivo ha sido describir las características clínicas, analíticas y evolución de los pacientes con IC crónica en tratamiento con iSGLT2 asociado o no a ARM. Se plantea la hipótesis de que el uso de ARM podría asociarse a una evolución clínica similar o mejor, sin aumento de efectos adversos, incluso en pacientes con FEVI preservada.

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo multicéntrico en dos hospitales de tercer nivel donde se incluyeron pacientes en seguimiento en la unidad de Insuficiencia Cardiaca desde 2023 hasta 2025. Para detectar diferencias significativas se utilizaron tablas de contingencia y T de Student en función de la variable. Además, se realizó una regresión logística para identificar factores asociados al uso de ARM, expresados en *odds ratios* (OR). Se han analizado variables analíticas y de evolución a los 3 y 6 meses del inicio del ARM.

Resultados: Se incluyeron 168 pacientes, todos en tratamiento con iSGLT2, de los cuales 98 (58,3%) recibían ARM y 70 (41,7%) no. De los pacientes con ARM, 55 presentaban FEVI preservada (56,1%) y 43 reducida (43,9%) (p = 0,043). Entre los que no recibían ARM, 50 tenían FEVI preservada (71,4%) y 20 reducida (28,6%). Las características clínicas, comorbilidades y tratamientos farmacológicos vienen recogidas en las tablas. En el análisis multivariante realizado, los pacientes con ARM tenían FEVI reducida (OR 1,9; p = 0,045), IMC dentro del rango normal o sobrepeso (OR 1,95; p = 0,038), tratamiento concomitante con ARNi (OR 21,23; p = 0,024) e IECA/ARA II (OR 2,6; IC95% 1,4-5,1; p < 0,05). Con respecto a la analítica, no se obtuvieron diferencias significativas en la creatinina, filtrado glomerular y niveles de potasio sérico a los 3 y 6 meses tras el inicio del tratamiento. En cuanto a la evolución, solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las visitas a urgencias a los 3 meses (p = 0,022), pero no en el reingreso ni la mortalidad.

Variable ARM sí p ARM no p

Preservada $(n = 55)$	Reducida (n = 43)	Preservada $(n = 50)$							
Sexo Varón	25 (45%)	22 (51,2%)	0.575	19 (38%)	10 (50%)	0,357			
Mujer	` ,	21 (48,9%)	.,.	31 (62%) 84,34 (±	10 (50%) 82,55 (±	- ,			
Edad	6,69 DE)		0,934	10,2 DE)	7,98 DE)	0,483			
Obesidad									
Normopeso-sobrepeso	038 (69,1%)	30 (69,8%)	0,639	25 (50%)	0,002	9 (45%)			
Obesidad ≥ tipo 1	21 (38,2%)	13 (30,2%)		25 (50%)		11 (55%)			
Clase funcional (NYHA)									
I	12 (21,8%)	7 (16,3%)		6 (12%)		3 (15%)			
II	26 (47,3%)	23 (53,5%)	0,633	22 (44%)	0,328	12 (60%)			
III	14 (25,5%)	11 (25,6%)		17 (34%)		5 (25%)			
IV	3 (5,5%)	2 (4,7%)		5 (10%)					
Diabetes mellitus ti	po 2								
No	26 (47,3%)	27 (62,8%)	0,126	28 (56%)	0,405	9 (45%)			
Sí	29 (52,7%)	16 (37,2%)		22 (44%)		11 (55%)			
Hipertensión arteri	al	22 (44/0) 11 (33/0)							
No	4 (7,3%)	3 (7%)	0,955	5 (10%)	0,259	4 (20%)			
Sí	51 (92,7%)	40 (93%)		45 (90%)		16 (80%)			
Dislipemia									
No	20 (36,4%)	20 (46,5%)	0,31	24 (28%)	0,364	12 (60%)			
Sí	35 (63,6%)	23 (53,5%)		26 (52%)		8 (40%)			
Enfermedad renal crónica									
No	34 (61,8%)	24 (55,8%)	0,405	24 (48%)	0,02	11 (55%)			
Sí (≥ G3a)	, , ,	19 (44,2%)		26 (52%)		9 (45%)			
Fibrilación auricula									
No	, , ,	15 (34,9%)	0,476	18 (36%)	0,517	7 (35%)			
Sí		28 (65,1%)		32 (64%)		13 (65%)			
Cardiopatía isquémica									
No	45 (81,8%)	30 (69,8%)	0,162	48 (96%)	0,106	17 (85%)			
Sí	10 (18,2%)	13 (30,2%)		2 (4%)		3 (15%)			

Variable ARM si (n = 98) _I PreservadaReducida I		$\mathbf{ARM} \ \mathbf{no} \ (\mathbf{n} = 70)\mathbf{p}$							
		Preservada							
	Furosemid	la							
	No	7 (12,7%)	5 (11,6%)		5 (10%)		3 (15%)		
	< 80 mg	30 (54,5%)	30 (69,8%)	0,234	32 (64%)	0,035	16 (80%)		
	≥ 80 mg	15 (27,3%)	5 (11,6%)		11 (22%)		1 (5%)		
	Otros	2 (3,6%)	3 (7%)		2 (4%)				
IECA/ARA II									
	No	33 (60%)	31 (72,1%)	0,212	22 (44%)	0,49	7 (35%)		
	Sí	22 (40%)	12 (27,9%)		28 (56%)		13 (65%)		
	ARNi								
	No	44 (80%)	26 (60,5%)	0,034	49 (98%)	0,496	19 (95%)		
	Sí	11 (20%)	17 (39,5%)		1 (2%)		1 (5%)		
	Betabloqu	eantes							
	No	10 (18,2%)	10 (23,3%)	0,536	21 (42%)	0,589	7 (35%)		
	Sí	45 (81,8%)	33 (76,7%)		29 (58%)		13 (65%)		

Conclusiones: En este estudio multicéntrico, las características clínicas y comorbilidades de los dos grupos eran muy similares. Los pacientes que recibían ARM tenían FEVI reducida y tratamiento concomitante con ARNi, tal como se recomienda en las guías de insuficiencia cardiaca, mientras que

el grupo que no recibía ARM tenían prescrito más tratamiento diurético, lo que nos hace pensar que estos pacientes se podrían beneficiar del tratamiento con ARM, reduciendo la necesidad de otros tratamientos diuréticos. En nuestra cohorte, el uso de ARM no se ha visto asociado a empeoramiento del FG ni el aumento del potasio que son los principales efectos secundarios que limitan su uso. En cuanto a la evolución, no se han demostrado diferencias significativas en cuanto a mortalidad, reingresos ni visitas a urgencias posiblemente por el corto tiempo de seguimiento. Se requieren estudios prospectivos con mayor tiempo de seguimiento para evaluar su impacto en eventos duros como mortalidad y hospitalización.