

Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

IF-019 - ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DE LA ENFERMEDAD RELACIONADA CON IGG4 EN UNA MUESTRA DE PACIENTES DEL HOSPITAL MIGUEL SERVET

L. Fumanal Idocin¹, G. González Tristante², J. García Bruñén¹, M. Forga Gracia¹, U. Asín Samper¹, M. Requena Calleja¹, J. Escobedo Palau¹ y J. Velilla Marco¹

¹Medicina Interna. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. ²Estudiante 6º de Medicina. Facultad de Medicina. Universidad de Zaragoza. Zaragoza.

Resumen

Objetivos: Comparar el procedimiento diagnóstico realizado y resultados obtenidos en una muestra de pacientes con elevación de IgG4 sérica del Hospital Universitario Miguel Servet con el descrito en la literatura.

Material y métodos: Revisión bibliográfica mediante la base de datos Pubmed. Se seleccionó a los sujetos con al menos una determinación de IgG4 135 mg/dL para revisar su historial médico a partir de las 5289 determinaciones séricas de IgG4 realizadas en el HUMS entre 26/05/2005 y el 19/01/2018.

Resultados: Valores analíticos: IgG4 sérica: En nuestra muestra se hallaron diferencias significativas en cuanto a los niveles de IgG4 séricos al comparar diagnóstico de ER-IgG4 192 (160,5-342) con "No ER-IgG4" 172 (143,75-228,07) p = 0,038, siendo más elevados en los pacientes con ER-IgG4. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el análisis por subgrupos con "Neoplasias sólidas" (p = 0,089) y "Enfermedad hematológica" (p = 0,389) entre otros. El ratio IgG4/IgG en suero ≥ 0,08 propuesto como útil para el diagnóstico de ER-IgG4 no mostró diferencias estadísticamente significativas entre la ER-IgG4 y el resto de enfermedades (p = 0,111) ni con ninguno de los subgrupos de más de 6 pacientes (p > 0,05). Los valores séricos de IgG4 son, generalmente, más elevados a mayor número de órganos afectados. Este hallazgo no se replicó en nuestra muestra (p = 0,6): multiorgánica 191 mg/dL (156-409,5), un órgano: 192 mg/dL (176-329,5). Otros valores analíticos: los pacientes con ER-IgG4 mostraron valores de IgG2 significativamente más elevados y sin embargo los "No ER- IgG4" lo hicieron de eosinófilos. Histología: De los 21 pacientes con ER-IgG4, sólo cinco pacientes tenían biopsia (23,8%) y todas altamente sugestivas de ER-IgG4. Imagen: El 100% (n = 21) de nuestros pacientes con ER- IgG4 tenían un TC, 13 una RM y 6 un PET-TC. Criterios diagnósticos: Se utilizaron los criterios japoneses, que permiten diagnóstico sin biopsia, con el resultado de 16 casos posibles, 3 definitivos y 2 probables.

Enfermedad	IgG2 mg/dl	IgE UI/mI	VSG mm/hora	PCR mg/dl	Eosinófilos /μΙ
	Med(Rango IQ)	Med(Rango IQ)	Med(Rango IQ)	Med(Rango)	Med(Rango IQ)
ER-lgG4	471,5	45	33,5	0,63	100
n=21	(368,75-673)	(14,58-147,87)	(16,25-67,5)	(0,41-4,71)	(0-250)
No ER-IgG4	365,5	109,7	29	0,7	200
n=226	(268,5-528,25)	(29,7-594,3)	(12-63)	(0,19-2,26)	(100-400)
Significación	p<0,041	p=0,22	p=0,62	p=0,6	p<0,024

Comparación de los valores séricos de distintos parámetros analíticos entre el grupo de ER-IgG4 y el grupo sin ER-IgG4.

Discusión: En nuestra muestra, la elevación de IgG4 sérica sí fue significativamente más elevada en los pacientes con ER- IgG4 respecto los "No ER-IgG4" pero ni resultó específica de esta enfermedad, ni se relacionaba con el número de órganos afectados ni el ratio IgG4/IgG sérico > 0,08 mostró asociación significativa. Estos resultados van en la línea de los obtenidos hasta ahora en cuanto a que la determinación de IgG4 sérica se debe interpretar en un contexto clínico. La buena respuesta a corticoides empíricos y el uso de los criterios de japoneses frente a los internacionales son posibles causas del bajo número de pacientes que fueron sometidos a biopsia en nuestra muestra.

Conclusiones: La ER-IgG4 cursa con valores séricos de IgG4 más elevados en comparación con el grupo de pacientes con IgG4 elevada sin ER-IgG4, pero dicha diferencia no es significativa respecto a los diversos subgrupos diagnósticos por lo que no es un criterio suficiente para el diagnóstico. Son necesarios más estudios sobre población no japonesa para definir unos criterios más extrapolables.