

Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

V-107 - EFECTO DEL ÁCIDO ZOLEDRÓNICO SOBRE LAS CITOQUINAS IMPLICADAS EN EL METABOLISMO ÓSEO Y EN LA ANGIOGÉNESIS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD ÓSEA DE PAGET

N. Casillas Ramos¹, I. Calero Paniagua¹, D. Mora Peña¹, R. Usategui-Martín², I. Fuentes Calvo³, J. del Pino-Montes⁴, R. González Sarmiento² y C. Martínez-Salgado³

¹Medicina Interna. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca. ²Unidad Medicina Molecular. Universidad de Salamanca. Salamanca. ³Fisiología y Farmacología. TRECARD. Universidad de Salamanca. Salamanca. ⁴Reumatología. Hospital Universitario de Salamanca. Hospital Clínico. Salamanca.


Resumen

Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar los niveles plasmáticos de diversas citoquinas implicadas en el metabolismo óseo (OPG, RANKL, esclerostina) y en la angiogénesis (VEGF, P1GF, endoglina) en pacientes con enfermedad ósea de Paget (EOP), además de la respuesta tras tratamiento con ácido zoledrónico (ZOL) pautado en los pacientes con enfermedad activa.

Material y métodos: Se estudiaron 70 pacientes diagnosticados de EOP, 29 con enfermedad activa. Se recogieron variables clínicas y se llevo a cabo la determinación de los niveles plasmáticos de FA, OPG, RANKL, esclerostina, VEGF, P1GF y endoglina basales, a los 3 y a los 12 meses de tratamiento con ZOL 5 mg en aquellos pacientes con enfermedad activa.

Resultados: No hubo diferencias estadísticamente significativas en los niveles plasmáticos de OPG, RANKL, esclerostina, VEGF, P1GF y endoglina entre pacientes con EOP activa e inactiva. La FA disminuyó a los 3 y 12 meses después del tratamiento. Los niveles de RANKL se redujeron y los niveles de esclerostina aumentaron después de 12 meses. Los niveles de PlGF fueron menores tras 12 meses, mientras que no hubo diferencias en el VEGF plasmático y la endoglina después del tratamiento.

	EOP ACTIVO	EOP INACTIVO	p-valor
FA ajustado, valor ± SD	1.99 ± 1.05	0.63 ± 0.16	<0.001
RANKL, valor ± SD	0.07 ± 0.03	0.06 ± 0.04	0.159
Esclerostina, mediana (min;	131.26 (86.59;	120.84 (32.34;	0.397
max)	194.01)	423.32)	
OPG, mediana (min; max)	4.53 (2.48; 8.36)	7.46 (2.27; 14.31)	0.277
P1GF, valor ± SD	9.26 ± 5.68	10.21 ± 6.37	0.728
VEGF, valor ± SD	98.86 ± 107.02	57.11 ± 43.07	0.254
Endoglina, valor ± SD	3.80 ± 0.95	4.28 ± 0.69	0.178



Discusión: Nuestros resultados mostraron que los pacientes con EOP activa tienen niveles más altos de RANKL y niveles más bajos de OPG que los pacientes con EOP inactiva, aunque no se alcanzó la significación estadística probablemente por el número de pacientes. Estos resultados traducirían el mayor recambio óseo observado en la EOP. No hubo diferencias en los niveles plasmáticos de esclerostina entre los pacientes con EOP activa e inactiva, lo que parece sugerir que esta proteína no está involucrada en la fase activa de la enfermedad. La disminución en los niveles de RANKL observados 12 meses después están en concordancia con la reducción de la resorción ósea que produce este tratamiento. Por otro lado, el aumento en los niveles de esclerostina observados después del tratamiento reflejaría la reducción de la formación excesiva de hueso que ocurre en pacientes con EOP activa.



0014-2565 / \odot 2018, Elsevier España S.L.U. y Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Todos los derechos reservados.