

Revista Clínica Española



https://www.revclinesp.es

RV/H-19. - COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN GENERAL. EXPERIENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOI. CAMPAÑA "LA TENSIÓN NO DUELE"

A. Lorente Cànoves¹, V. Giner Galvañ¹, M. Reig Botella¹, I. Jara Calabuig¹, M. Esteban Giner¹, M. Córcoles Ferrándiz², C. Sánchez García², M. Rico Pastor²

¹Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. ²Farmacia Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alcoy. Alicante.

Resumen

Objetivos: Conocer el perfil tensional de un grupo representativo de la población general adulta.

Métodos: El 15 de febrero de 2014 el Servicio de Medicina Interna de Alcoy organizó una campaña de detección precoz en población adulta de PA elevada mediante triple toma casual con manguito según perímetro braquial y una encuesta sobre hábitos de control tensional.

Resultados: Participaron 144 personas (76,4% mujeres con 56,4 \pm 12,1 años, un 23% con 40-50 años de edad y un 86% menores de 65 años), 19,4% con HTA conocida, 4,9% cardiópatas conocidos, y un 2,1% de diabéticos. En un 3,5% de casos se detectó un perímetro braquial \geq 32 cm, porcentaje que llegaba a 14% en presencia de cardiopatía, siendo algo mayor en varones (4,3 vs 3,1; p 0,162). Los valores de PA (media de segunda y tercera de tres medidas) fueron mayores en pacientes con antecedente de HTA y/o diabetes aunque sin llegar a la significación estadística (tabla). Al definir como variabilidad la diferencia de valores entre diferentes medidas se observó significación estadística entre la 1ª y 2ª medidas para PAS (5,0 \pm 10,3 mmHg; p < 0,0001) y FC (1,3 \pm 5,4 lpm; 0,004) así como entre 1ª y 3ª (PAS: 5,5 \pm 8,9 mmHg; p < 0,0001. FC: 1,5 \pm 6,1 lpm; p 0,005). Entre hipertensos, diabéticos y cardiópatas sólo para PAS hubo variabilidad apreciable pero sin llegar a la significación estadística. El 23,6% de la muestra mostró PA elevada (PAS y/o PAD \geq 140/90 mmHg), mayoritariamente por elevación de PAS (19,5 vs 11,6%).

Valores tensionales globales y según existencia de HT y/o DM conocidas							
	Global	HTA	No HTA	HT vs no	DM	No DM	DM vs no
				HT			DM
PAS (mmHg)	126,6 ±	131,7 ±	125,2 ±	0,084	137,0 ±	126,2 ±	0,0001
	17,8	13,7	18,5		2,3	17,9	
PAD (mmHg)	$77,6 \pm 10,6$	$80,1 \pm 7,4$	$76,8 \pm 11,1$	0,133	$85,2 \pm 6,8$	$77,3 \pm 0,6$	0,177
FC (lpm)	$73,7 \pm 10,4$	73.0 ± 11.9	$73,9 \pm 10,1$	0,702	83,0 ±	$73,6 \pm 0,3$	0,378
					14,5		

Discusión: Se ha obtenido una muestra etaria representativa de la población adulta no anciana de la ciudad de Alcoy. Destacan los mayores valores de perímetro braquial de diabéticos y cardiópatas

junto a mayores valores tensionales de DM e hipertensos y también de FC de diabéticos. Los mayores valores de PAS y FC de la primera respecto segunda y tercera mediciones y similitud entre segunda y tercera refuerza la necesidad de triple medición desechando la primera. Cerca de la cuarta parte de adultos presenta PA elevada de predominio sistólico.

Conclusiones: En población general sigue siendo recomendable la triple medición desechando la primera como método de evitar sobreestimación independientemente del RCV individual, máxime cuando hasta la cuarta parte de adultos tiene PA elevada grado 1 de predominio sistólico.