



<https://www.revclinesp.es>

RV/H-26. - UTILIZACIÓN DE LA MEDIDA DE PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA REALIZADA EN LAS OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA POR ATENCIÓN PRIMARIA. PROYECTO FARMAPRES-CV

I. Lucas Tomás¹, V. Giner Galván¹, B. Roig Espert², J. Tamarit García³, I. Bonig Trigueros⁴, C. Soler Portmann², M. Esteban Giner², M. Nicolau Laparra²


¹Servicio de Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. ²Servicio de Medicina Interna. Hospital de Manises. Manises. Valencia. ³Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. ⁴Servicio de Medicina Interna. Hospital Comarcal de Vinarós. Vinaròs Castellón.

Resumen

Objetivos: En los recientes años las principales Guías para el manejo de la HTA han insistido en la necesidad de implicar a enfermería y farmacia en el manejo de la HTA. Pero sería necesario conocer la valoración y uso que de la medida de la presión arterial clínica (PAc) en las oficinas de farmacia comunitaria (OFc) hacen los Centros de Salud (CS).

Métodos: Encuesta a médicos (Med) y enfermeros/as (Enf) de los CS de la Comunitat Valenciana (CV) a lo largo del año 2012 y 2013 como parte del proyecto FARMAPRES CV.

Resultados: Han respondido 822 profesionales de 13 de los 24 Departamentos de Salud de la CV de 113 CS, 64% médicos, con $22,5 \pm 9,8$ años de experiencia. El 54% afirma conocer cómo se mide la PA en las OFc, porcentaje mayor entre Enf (58,9 vs 50,2%; p 0,0001), varones (59,0 vs 49,0%; p 0,045) y a mayor experiencia ($23,9 \pm 9,7$ vs $20,8 \pm 7,9$ años; p 0,0001). Un 55% considera las mediciones fiables, sin diferencias por provincia, género, colectivo profesional o experiencia. Los 347 encuestados que valoran como no fiables las OFc dan como motivos (%): “Metodología inadecuada” (19,1), “Condiciones ambientales inadecuadas” (12,2), “Equipos inadecuados” (12,2), “Toma única” (10,7), “Ausencia de formación específica” (10,3) y “Sobrevaloración de PA” (8,9). La frecuencia de uso de las OFc son los recogidos en el gráfico. Enfermería (37,2 vs 27,7%; p 0,0001) y personal con mayor experiencia ($23,7 \pm 9,9$ vs $22,1 \pm 9,7$; p = 0,023) nunca usa la PAc de las OFc.



Discusión: La mitad de profesionales de los CS dice conocer cómo se mide la PAc en las OFc de su ámbito y cree fiables las mediciones. A pesar de ello, el uso habitual es anecdótico, sobre todo entre personal de Enfermería y con mayor experiencia. Las mayores críticas son las relativas a una inadecuada metodología.

Conclusiones: A pesar de su reconocido potencial, existe actualmente un gran abismo a salvar a la hora de cambiar la forma de trabajo en HTA integrando a colectivos alternativos como son las Oficinas de Farmacia Comunitaria.