



<https://www.revclinesp.es>

V-077 - DERRAME PLEURAL EN LAS PERICARDITIS AGUDAS

E. Corral Armas, P. Bagüeste Morán, S. Bielsa Martín, J. Porcel Pérez

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida.

Resumen

Objetivos: La pericarditis aguda es generalmente idiopática o vírica. La radiografía de tórax evalúa el tamaño de la silueta cardiaca y la presencia de derrame pleural. Este último se observa en alrededor del 20% de las pericarditis agudas víricas. El objetivo del estudio fue: describir las características radiológicas y bioquímicas del líquido pleural en los pacientes con pericarditis aguda idiopática o vírica.

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de las características clínico-radiológicas y bioquímicas del líquido pleural de todos los pacientes consecutivos con pericarditis aguda idiopática a los que se realizó una toracocentesis diagnóstica por la existencia de un derrame pleural asociado, en el periodo 2000-2014 en nuestro centro. El diagnóstico de pericarditis aguda idiopática se realizó después de excluir enfermedades malignas, bacterianas, reumatólogicas o endocrinológicas, y confirmar la resolución del proceso durante el seguimiento.

Resultados: En la tabla se resumen las características epidemiológicas, radiológicas y bioquímicas del líquido pleural de los 83 pacientes incluidos en el estudio. Alrededor del 90% de los derrames pleurales ocuparon un tercio o menos de un hemitorax en la radiografía simple y fueron izquierdos o bilaterales. Sólo un 5% (4 pacientes) cumplieron criterios de Light de trasudado. La mayoría se asociaron a derrame pericárdico, en general de pequeño tamaño.

Pericarditis víricas o idiopáticas N = 83. Las variables cualitativas se expresan como n (%) y la cuantitativas como mediana (cuartiles 25-75)

Sexo varón	49 (59)
Edad, años	67 (55-75)
Tamaño derrame pleural	
? 1/3	58 (88)

1/2	8 (12)
? 2/3	0
Localización derrame pleural	
Derecho	4 (5)
Izquierdo	38 (51)
Bilateral	33 (44)
Proteínas LP ? 3,5 g/dL	62 (75)
LDH LP ? 2/3 límite superior normal en suero	23 (28)
LDH suero, U/L	309 (255-380)

Discusión: Ninguna serie de pericarditis aguda ha evaluado hasta la actualidad las características bioquímicas del líquido pleural.

Conclusiones: Los derrames pleurales asociados a pericarditis víricas son de pequeño tamaño, izquierdos o bilaterales y con características de exudado.