



<https://www.revclinesp.es>

## IF-003 - ESTUDIO UNICÉNTRICO DESCRIPTIVO DE SARCOIDOSIS 1976-2015

*N. Villalba, M. Rubio, M. Labori, X. Corbella, J. Mañá*

*Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).*

### Resumen

**Objetivos:** Estudio observacional de una cohorte de pacientes con sarcoidosis.

**Material y métodos:** Estudio retrospectivo de 640 pacientes diagnosticados en un periodo de 40 años en el Hospital de Bellvitge.

Tabla 1

| Variable              | Variable                      | Valor absoluto (porcentaje) |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Sexo                  | Mujer                         | 438 (68,4%)                 |
|                       | Varón                         | 202 (31,6%)                 |
| Forma de presentación | EN/IPT                        | 263 (41,1%)                 |
|                       | Tos/disnea                    | 101 (15,8%)                 |
|                       | Lesiones cutáneas específicas | 60 (9,4%)                   |
|                       | Asintomático                  | 54 (8,4%)                   |
|                       | Artralgias/itis               | 36 (5,6%)                   |

Tabla 2

| Variable                           | Variable | Valor absoluto (porcentaje) |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Estadio radiológico al diagnóstico | 0        | 56 (8,8%)                   |
|                                    | 1        | 387 (60,5%)                 |
|                                    | 2        | 143 (22,3%)                 |
|                                    | 3        | 42 (6,5%)                   |
|                                    | 4        | 12 (1,9%)                   |

Tabla 3

| Variable                       | Variable                | Valor absoluto (porcentaje) |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Manifestaciones extratorácicas | Eritema nudoso/IPT      | 296 (46,2%)                 |
|                                | Artralgias/artritis     | 239 (37,3%)                 |
|                                | Fiebre/febrícula        | 151 (23,6%)                 |
|                                | Piel                    | 133 (23,8%)                 |
|                                | Adenopatías periféricas | 114 (17,8%)                 |

**Conclusiones:** Predominancia en mujeres no fumadoras en la edad media de la vida. La forma de presentación más frecuente fue eritema nudoso e inflamación periartricular de tobillos, seguido de síntomas respiratorios. El síndrome de Löfgren constituyó el 46,2% de los casos. El 83% de los pacientes presentaron estadio radiológico I/II al diagnóstico. La ECA estaba elevada en el 51% de los casos. La variedad de afectaciones extratorácicas refuerza el concepto de que la sarcoidosis es una enfermedad sistémica.