



<https://www.revclinesp.es>

V-145 - ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: ¿CUMPLEN NUESTROS PACIENTES EL TRATAMIENTO PRESCRITO?

L. Prieto Gañán¹, J. Sánchez Gundín², L. Gómez Romero³, J. Vicente Rodrigo¹, D. Mora Peña¹, M. Cuerda Clares¹, J. Ramírez Luna¹ y J. Nieto Rodríguez¹

¹Medicina interna; ²Farmacia; ³Neurología. Hospital General Virgen de la Luz. Cuenca.

Resumen

Objetivos: Conocer la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple (EM) en tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad (FME) orales e inyectables. Definimos adherencia como grado de cumplimiento con el régimen terapéutico prescrito.

Material y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes diagnosticados de EM en tratamiento con FME orales e inyectables en un hospital general de segundo nivel entre junio de 2011 y febrero de 2017. Los datos recogidos fueron la edad, sexo, FME empleado, adherencia y duración del tratamiento. Los datos de adherencia fueron recogidos mediante entrevista personalizada y el programa de dispensación a pacientes externos (Farmatools). Las tasas de adherencia se cuantificaron mediante el índice de posesión de medicación, definido como la relación entre las dosis de fármaco dispensadas, o cobertura teórica, y las dosis necesarias, o cobertura real. Se tomó como referencia la siguiente vez en que el paciente acudía a recoger medicación. Calculamos las tasas de adherencia para cada fármaco y la media de adherencia de FME orales vs inyectables.

Resultados: Se incluyeron 120 pacientes con una media de edad de 45 años y predominio femenino (76%): FME de administración oral: Fingolimod: 18% de pacientes, adherencia media 99,46% y mediana de duración del tratamiento 2 años y 1 mes. Dimetilfumarato: 13% de pacientes, adherencia media 96,82% y mediana de duración del tratamiento 1 año. Teriflunomida: 12% de pacientes, adherencia media 97,97% y mediana de duración del tratamiento 1 año y 5 meses. FME de administración inyectable: Interferon-? 1a: 61% de pacientes, adherencia media 97,34% y mediana de duración tratamiento 3 años y 5 meses. Interferon-? 1b: 9% de pacientes, adherencia media 94,48% y mediana de duración del tratamiento 3 años y 7 meses. Acetato de glatirámero: 22% de pacientes, adherencia media 97,50% y mediana de duración del tratamiento 2 años y 4 meses. Peginterferon-? 1a: 13% de pacientes, adherencia media 99,25% y mediana duración del tratamiento 9 meses. Natalizumab: 8% de pacientes, adherencia media 100% y mediana duración del tratamiento 1 año y 10 meses. Alemtuzumab: 2% de pacientes, adherencia media 100% y mediana de duración de tratamiento 1 año y 7 meses. La adherencia media de FME orales se situó en 98,08% y FME inyectables en 98,09%.

Discusión: La adherencia terapéutica en la esclerosis múltiple es fundamental para conseguir un resultado terapéutico óptimo y se asocia a mejor evolución y disminución del gasto sanitario. El seguimiento estrecho en la consulta externa de Neurología y en consulta de atención farmacéutica son claves en dicha adherencia.

Conclusiones: Existen diferentes estudios que evalúan la adherencia terapéutica en esclerosis múltiple con resultados muy variables (60-90%): concluimos por tanto que los resultados obtenidos en nuestro estudio son altos (98%) independientemente de la vía de administración.